Observation sur un hydrocephale

L'enfant dont s'agit avoit la teste beaucoup plus grosse qu'elle ne devoit l'etre en naissant et augmentant de jour en jour elle lui fut toujours tres sensible a la partie superieure et posterieure.
Il n'eut d'abord que cette sensibilité, et un feu volage au menton qui lui dura jusqu'a l'age de trois ans, auquel temps l'humeur se jetta par metastase sur les bras et derriere les oreilles
a un an il avoit presque toutes ses dents sans avoir que tres peu salivé, ses yeux etoient dans un mouvement continuel et ne pouvoient se fixer sur aucun objet, l'iris en etoit tres dilaté, et avoit fort peu de mouvement de constriction, il ne voioit que foiblement, et sa vue diminua insensiblement jusqu'a l'age de trois ans qu'il ne vit plus du tout. il lui survint ensuite des legers mouvemens convulsifs de tout le corps, a quoy succeda un espece de Ris sardonien toutes les fois qu'il alloit a la selle et qui lui duroit tout le temps qu'il restoit sur le bassin, ce qui ne l'empechoit pas cependant de repondre quand on l'interrogeoit, mais toujours en riant. Cette maniere lui duroit quelsque fois huit ou quinze jours quelsque fois plus quelsque fois moins, tout ce cy fut suivie d'assoupissement d'une fievre lente avec des redoublemens de temps en temps et alors il lui sortoit du pus par les yeux, par le nez par les oreilles et par la bouche, ses urines memes qui etoient tres epaisses paroissoient en etre remplis, ainsy que ses selles

ARC 43 n° 164 (B)
Académie Nationale de Médecine

Ce meme accident, toujours precedé des redoublemens, parut

parut plusieurs fois,
sa sueur etoit tres fœtide, a Cinq ans il tomba dans Le marasme et

mourut ainsy a six, toutes les articulations des extremités

inferieures ankilosés, a Cinq ans et demy il lui Survint une salivation

tres abondante sans qu'aucunes autres Causes que La mauvaise

disposition de son temperament y eussent Contribués, cette salivation

ne Cessa que peu de temps avant sa mort, Car alors sa salive devint

si gluante et si Collante, qu'a peine pouvoit il ouvrir La bouche pour

parler, ce quoy ne Contribuoit pas peu Le grand accablement ou il

etoit, pendant tout cet intervalle il restoit quelques fois Cinq a six jours

sans aller a La selle, a Cause de La difficulté de lui faire quelques choses,

vu Le triste Etat ou il se trouvoit. Ses selles etoient noires et tres dures,

souvent aussi il Restoit Cinq a six jours sans prendre d'alimens ny

solides ny Liquides, Ce qui etoit suivi d'une faim Canine

qui L'obligeoit a manger Considerablement et meme La nuit

de sorte que son Estomac ne pouvant souffrir Longtemps La grande

quantité d'alimens qu'il prenoit, il etoit obligé de les rejetter

par Le vomissement, ainsy qu'une grande quantité de glaire

C'est dans L'alternatif de toutes ces choses qu'il passa

miserablement Les six derniers mois de sa vie il faut de plus

observer qu'a Cinq ans on Lui Coupa les cheveux qui ne prirent

aucun accroissement dans L'espace d'un an qu'il vecut encor,

et qu'il a Rendus plusieurs fois des vers. . .

ayant. Levé Le Cuir chevelu, et Le pericrane, 1° je mesura
La Circonference du Crane ainsy decouvert elle etoit d'une demie
aulne de france; depuis La partie moyené du Coronal Entre les deux
Sinus sourcilliers en Suivant La Suture sagittale jusqu'a cette Eminence
qu'on nomme La nuque, il y avoit un quart et une taille et demi
La teste Etoit fort Longue et grosse sur Le derriere, toute La face se trouvoit
dans une juste proportion avec Le Reste du Corps, L'os coronal Etoit tel
qu'il devoit L'etre naturellement, mais les deux temporaux les deux
parietaux, et L'occipital Etoient Extremement augmentés de volume par
Rapport a Leurs Expantion, Et Etoient devenus aussi minces qu'une
feuille de papier; ayant Levé Le Crane je n'apercu Rien
d'Extraordinaire Le Cerveau qui paroissoit sain en Remplissoit
toute La Cavité je donna d'abord un Coup d'escarpel a La dure mere,
a Suivant mon incision Le Long de La faulx je fus surpris de voir Le
Cerveau s'affaisser subitement et au moins trois pintes d'eau dans
une terrine que j'avois eu La precaution de faire mettre sous La teste,
ayant Continué mon incision jusqu'aux ventricules supperieurs
je Les trouva si dilattés que je pouvoir tourner a L'aise Le poing
dedans, Le temps ne me permettant pas de faire des Longues
Recherches je negligea celles des autres ventricules, d'autant plus
que La Communication qu'ils ont entre Eux ne me permettoit pas
de douter de Leurs dilatation, C'est pourquoy je passa d'abord
a La Base que je trouva toute Remplies de Stéatomes de la grosseur
d'un oeuf de pigeon, Ce qui se trouvoit Egalement a la Base
du Cervelet
Les nerfs optiques que La chute precipité du Cerveau avoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

dabord de Robé a ma vue, Ressembloit tout a fait a quelsques
tendons ou autres matières visqueuses que l'on auroit laissé
Longtemps macerer dans L'eau et ne faisoir plus qu'une espece
de gelée on y Reconnoissoit aucunes parties fibreuses, La glande
pituitaire et ses membranes etoiens de mêmes, j'ay donné en outre
plusieurs Coups d'escarpel a la substance du Cerveau, Le j'ay trouvé
assez sain sinon que vers les partie voisines de la glande pituitaire
qu'il paroissoit un peu Livide.

Blanquart chirurgien
dans l'hopital D'aire
En flandres.